

Verpflichtende Informationen über Lebensmittel
 - gemäß Art. 9, Abs. 1 Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)
 Stand: 07/2016

Saltadol® Glucose-Elektrolyt-Mischung

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät)
 Pulvermischung

Zur diätetischen Behandlung von Flüssigkeitsmangel (Dehydration) bei Durchfallerkrankungen.

Zutaten

Traubenzucker, Kochsalz, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel Acesulfam K und Aspartam.

Mit Süßungsmittel. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Enthält keine Stoffe oder Erzeugnisse gemäß Anhang II, LMIV, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen.

Nährwertdeklaration

	pro 100 g	pro Einzeldosis (200 ml)
Brennwert kJ/kcal	1111/261,5	45,9/10,8
Fett	0 g	0 g
-gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g
Kohlenhydrate	65,38 g (5,3 BE)	2,7 g (0,22 BE)
- Zucker	65,38 g (5,3 BE)	2,7 g (0,22 BE)
Eiweiß	0 g	0 g
Salz	12,6 g	0,52 g
	pro 100 g	pro Einzeldosis (200 ml)
Natrium	7748 mg	320 mg
Kalium	3874 mg	160 mg
Chlorid	11138 mg	460 mg

Elektrolytgehalt der fertigen Lösung

Na⁺ 75 mmol/l

K⁺ 20 mmol/l

Cl⁻ 65 mmol/l

Citrat 10 mmol/l

D-Glucose 75 mmol/l

Osmolarität nach Zubereitung: ca. 245 mmol/l

Der Mineralstoffgehalt wurde der erforderlichen Osmolarität angepasst.

Packungsgrößen/Inhalt (netto)

Packungen zu 6 Beuteln = 24,78 g (PZN: 11661762) und

Packungen zu 12 Beuteln = 49,56 g (PZN: 11661779)

.../2

Verpflichtende Informationen über Lebensmittel
- gemäß Art. 9, Abs. 1 Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)
Stand: 05/2016

Anweisungen für Aufbewahrung/

Anweisungen für die Verwendung

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Kühl und trocken lagern.

Ein Beutel enthält 4,13 g Pulvermischung.

Der Inhalt eines Beutels wird in 200 ml abgekochtem, abgekühltem Wasser oder Tee aufgelöst und warm oder kalt getrunken. Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sie dauert bei Säuglingen und Kleinkindern in der Regel 6 – 12 Stunden, maximal 24 Stunden.

Säuglinge:

bei Weglassen jeder Nahrung über 24 Stunden verteilt eine Trinkmenge von 120 – 150 ml pro kg/Körpergewicht. Pro Stunde sollte die Trinkmenge ca. 10 ml/kg Körpergewicht betragen. Die Tagesmenge sollte bei Säuglingen auf 6 Beutel begrenzt werden.

Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene:

Trinken, je nach Bedarf, mehrmals täglich den Inhalt des Beutels, gelöst in 200 ml Flüssigkeit. Erwachsene können bei starkem Durchfall bis zu 4 Liter Saltadol® über den Tag verteilt trinken. Dies entspricht einer Menge von 20 Beuteln

Saltadol® ist geschmacksneutral, glutenfrei und lactosefrei.

Wichtige Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen

Geeignet für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Nicht zur Selbstbehandlung schwerer Durchfälle verwenden, die länger als 3 Tage andauern. Patienten mit Herzschwäche und erhöhtem Blutdruck sowie Diabetiker bitte vorher den behandelnden Arzt befragen. Bei gleichzeitiger Therapie mit Herzwirksamen Glucosiden bitte sorgfältig Kaliumgehalt (des Patienten) überwachen. Nicht anwenden bei Ausscheidestörungen der Nieren, metabolischer Alkalose, unstillbarem Erbrechen, Kohlenhydrataufnahmestörungen, Bewusstseinstörungen und Schock. Nicht anwenden bei akutem Flüssigkeitsmangel infolge von Verschlusserkrankungen im Verdauungstrakt. **Saltadol® bitte nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.**

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8 - 10

13435 Berlin

Tel: 030 71094-4200

Fax: 030 71094-4250

Hergestellt in Deutschland

Nur in Apotheken erhältlich.